



Enquête sur les séniors vivant avec une MICI

Michel Liberatore,  afa
Crohn · RCH · France

Guillaume Pineton de Chambrun, CHU Montpellier

Avec le soutien institutionnel de  MSD



A Martine,

avec la collaboration des membres de la commission « Séniors »

Corinne, Dominique, Madeleine, Mireille
membres du CA de l'association

et

de l'aimable contribution du Pr Guillaume Savoye (CHU de Rouen)

Rationnel



- Pic de fréquence des MICI entre 25 et 40 ans
- Mais:
 - Maladie chronique évoluant tout au long de la vie
 - Diagnostic possible à tout âge
- Constats de l'Observatoire des MICI sur les ALD-24 (Crohn et RCH)
 - En 2015, 44% des 145 000 ALD ont plus de 50 ans
- Problématiques spécifiques aux séniors atteints d'une MICI?
 - Activité de la maladie différentes?
 - Pathologies du grand âge pouvant être associées
 - Risque des traitements immunosuppresseurs
 - Problème de la dépendance

But du travail



- Connaitre les **caractéristiques démographiques et cliniques** des personnes âgés de **plus de 50 ans** vivant avec une MICI
- Evaluer la **qualité de vie** des personnes âgés de **plus de 50 ans** vivant avec une MICI

Méthodologie



- Questionnaire comportant **95 questions** concernant les caractéristiques démographiques, les données médicales et la qualité de vie des personnes âgées de plus de 50 ans vivant avec une MICI
- Elaboré par la commission « séniors » de **l'AFA**
- 1100 questionnaires « papier » envoyés aux membres de l'afa identifiés et à jour cotisation de plus de 50 ans en 2016
 - **440 réponses**
- Mise en ligne du questionnaire sur l'observatoire national des MICI (www.observatoire-crohn-rch.fr/) en **2016**
 - **266 réponses**
- Déclaration du questionnaire à la CNIL

Résultats



- Après élimination des doublons (n=47):
- **636** personnes âgés de plus de 50 ans avec une MICI ont répondu au questionnaire
- 23 autres personnes de moins de 50 ans ont répondu au questionnaire

Caractéristiques démographiques




	MICI seniors (n=636)
Femme % (n)	63% (403)
Age moyen (années)	63,7 ± 8,7
Age moyen au diagnostic de la maladie (années)	40,9 ± 14,3
Durée moyenne d'évolution de la MICI (années)	22,7 ± 13
Type de MICI % (n)	
<i>Maladie de Crohn</i>	54% (342)
<i>RCH</i>	42% (265)
<i>Colite indéterminée</i>	3% (19)


Caractéristiques démographiques




Repartition des séniors par tranches age




Caractéristiques démographiques




Conditions de vie




Conditions de vie - Lieu



Conditions de vie - Logement



Conditions de vie



Age des personnes vivant avec une MICI (n=636)



- 78 personnes \geq 75 ans (13%)
- 237 entre 62 et 65 ans (37%)
- 321 entre $<$ 62 ans (50%)



Age de diagnostic de la MICI (n=604)



- 72 personnes avec un diagnostic de MICI \geq 60 ans (12%)
- 514 avec un diagnostic à l'âge adulte $<$ 60 ans (85%)
- 18 avec un diagnostic pédiatrique \leq 17 ans (3%)






Comparaison en fonction de l'âge au diagnostic de la MICI



Homme ou Femme




Sexe-ratio en fonction de l'âge au diagnostic



Type de MICI




Type de MICI en fonction de l'âge au diagnostic



Durée d'évolution de la MICI




Durée moyenne d'évolution en année



Manifestations extra-digestives




Proportion de manifestations extra-digestives en fonction de l'âge au diagnostic



Activité de la maladie



Activité moyenne de la maladie en fonction de l'âge au diagnostic




Autoévaluation de l'activité de la maladie de 0 = rémission à 5 = maladie très active




Chirurgie pour la MICI



Taux de chirurgie pour la MICI en fonction de l'âge au diagnostic




Traitement en cours



Corticoïdes




Corticothérapie systémique




Immunomodulateurs



Aziathroprine




Anti TNF alpha




Autres pathologies



Autres pathologies



Fractures et prothèses






Comparaison en fonction de l'âge au moment de l'enquête des personnes vivant avec une MICI



Homme ou Femme




Sexe-ratio en fonction de la tranche d'âge des personnes




Type de MICI



Type de MICI en fonction de la tranche d'âge




Durée d'évolution de la MICI




Manifestations extra-digestives



Proportion de manifestations extra-digestives en fonction de la tranche d'âge




Chirurgie pour la MICI



Traitement en cours




Actuellement traité



Corticoïdes




Corticothérapie systémique




Immunomodulateurs



Aziathroprine




Anti TNF alpha




Autres pathologies



Autres pathologies



Fractures et prothèses







Qualité de vie



Impact sur la qualité de vie



■ Diagnostic >60ans ■ Diagnostic <60ans
 ■ Diagnostic pédiatrique




■ Patients ≥75ans ■ Entre 62 et 75 ans ■ ≤ 62 ans


Handicap et âge au diagnostic



Maladie considérée comme un handicap




Proportion de retraités




Handicap et tranche d'âge



Maladie considérée comme un handicap




Proportion de retraités






Nature du Handicap






Vous sentez vous globalement "bien pris en charge"







Vous sentez vous "bien suivi au long cours"




Avez-vous refusé de vous soigner ? Patients ≥ 75 ans



Avez-vous refusé de vous soigner ? Patients ≤ 62 ans




Avez-vous refusé de vous soigner ? Patients 75 ans - 62 ans






Evaluation de la coordination des soins entre spécialiste et généraliste (données : dans l'étude)






Evaluation de la coordination des soins entre spécialistes (données : dans l'etude)





Evaluation de la compréhension de la maladie Patients Tous - Rapport à l'étude



Discussion



- Enquête **extrêmement riche** concernant les personnes âgées de plus de 50 ans vivant avec une stomie
- Des **messages forts** apparaissent grâce à cette enquête

Messages forts



- Plus de 600 patients avec un âge moyen de 64 ans
- 5% des patients ont plus de 80 ans!
- 10% des patients vivent avec la maladie depuis plus de 40 ans
- Majorité de personnes vivant en couple, et propriétaire de leur maison

Age au diagnostic \geq 60 ans



- 72 personnes avec un diagnostic après 60 ans, âgés en moyenne de 74 ans \pm 7 ans
- Plus d'hommes que de femmes
- Seulement 39% de RCH
- Activité ressentie de la maladie aussi voir plus importante que les personnes diagnostiquées avant 60 ans
- Moins de Chirurgie, mais durée d'évolution plus courte
- Peu d'azathioprine, mais autant d'anti-TNF

Personnes de plus de 75 ans vivant avec une MICI



- Autant d'hommes que de femmes
- Plus de manifestations extra-digestives
- Autant de chirurgie pour la MICI que les autres tranches d'âges
- Moins de traitement par azathioprine ou anti-TNF et seulement des traitements locaux
- Nombreuses pathologies associées et fractures!

Qualité de vie



- La maladie est largement considérée comme un handicap avec un impact sur la qualité de vie
- L'activité professionnelle aggrave ce ressenti
- La sphère professionnelle est de loin la plus problématique concernant la compréhension de la maladie

Remerciements

- A toutes les personnes qui ont répondues au questionnaire
- Aux membres de la commission Séniors de l'association François Aupetit afa Crohn RCH France et ses permanents
- Au Pr Savoye (CHU ROUEN) et au Pr Pineton de Chambrun (CHU Montpellier)
- A Epimad, registre du nord de la France pour ses données Sénior
- A MSD pour son soutien institutionnel

